

Příbalová informace

Informace pro použití, čtěte pozorně !

DISOPHROL REPETABS

Dexbrompheniramin maleas
Pseudoephedrin sulfas

Tablety s řízeným uvolňováním

Držitel rozhodnutí o registraci

SP Europe, Bruxelles, Belgie

Výrobce

Schering-Plough Labo N.V., Heist-op-den-Berg, Belgie

Složení

Léčivé látky: dexbrompheniramin maleas 3,0 mg a pseudoephedrin sulfas 60 mg v zevní vrstvě tablety s řízeným uvolňováním a stejné množství léčivých látek je opakovaně ve vnitřním jádru tablety. Celkové množství v jedné tabletě: dexbrompheniramin maleas 6,0 mg a pseudoephedrin sulfas 120 mg. Pomocné látky: monohydrát laktosy, škrob, povidon, magnesium-stearát, dihydrát síranu vápenatého, síran vápenatý, sacharosa, mastek, arabská klovatina, kalafuna, želatina, zein, oxid titaničitý, kyselina olejová, mýdlo, butylparaben, bílý vosk, karnaubský vosk.

Indikační skupina

Antihistaminika, dekonjestans

Charakteristika

DISOPHROL REPETABS obsahuje kombinaci dvou léčivých látek, které slouží k léčbě překrvení sliznic horních cest dýchacích, které jsou projevem sezónní i celoroční alergie, senné rýmy, akutního zánětu nosohltanu (rýmy) a nosních cest, ucpání trubice spojující střední ucho a hltan (Eustachova trubice). Antihistaminikum dexbromfeniramin tlumí výtok z nosu, kýčání, slzení a svědění očí. Dekongestivum pseudoefedrin zmírňuje otok a překrvení slizničních membrán a jemně vysušuje a uvolňuje nosní cesty.

Indikace

Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti ve věku od 12 let ke zmírnění nebo potlačení příznaků rýmy alergického nebo jiného původu, při sezónní i celoroční alergické rýmě a ostatních onemocněních horních cest dýchacích spojených se zánětem vedlejších nosních dutin.

Kontraindikace

Přípravek DISOPHROL REPETABS nesmí užívat nemocní, kteří jsou přecitlivělí na jakoukoliv jeho složku. Přípravek nesmí užívat nemocní, kteří jsou léčeni inhibitory monoaminoxidázy nebo kteří léčbu těmito přípravky ukončili před méně než 14 dny, nemocní s vysokým krevním tlakem, s ischemickou chorobou srdeční a se zvýšenou činností štítné žlázy.

Opatrnosti je třeba u nemocných se zeleným očním zákalem (glaukóm), těžkostmi s močením způsobenými zvětšením prostaty a cukrovkou.

Během těhotenství a kojení lze přípravek užívat jen jsou-li pro to zvlášť závažné důvody.

Nežádoucí účinky

Přípravek je obvykle dobře snášen, může však způsobit malátnost (i lehkou až středně těžkou ospalost). Může se objevit neklid, nespavost, třes, křeče, slabost, nucení na zvracení, závratě, bolesti hlavy, bušení srdce, zvýšení krevního tlaku, dýchací obtíže, časté a vydatné nebo obtížné a bolestivé močení. Uváděny jsou rovněž nežádoucí účinky jako kopřivka, vyrážka po použití léku, zvýšená citlivost kůže na sluneční záření, nadměrné pocení, pocity mrazení, sucho v ústech, nose a v krku. Výskyt těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí vždy oznamte svému ošetřujícímu lékaři.

Interakce

Neužívejte tento přípravek v případě, že užíváte léky na léčbu vysokého krevního tlaku, tricyklická antidepresiva, barbituráty či jiné léky, působící útlum centrálního nervového systému.

Dávkování a způsob použití

Dospělí, mladiství a děti od 12 let užívají jednu tabletu ráno a jednu večer před spaním. Tablety se zapijí vodou.

Po počátečním zmírnění příznaků obvykle stačí jedna tableta denně jako udržovací dávka. Nikdy nepřekračujte doporučenou dávku.

Upozornění

Pseudoefedrin a jeho hlavní metabolit norpseudoefedrin jsou uvedeny na seznamu látek zakázaných pro sportovce (doping).

Při užívání přípravku se nedoporučuje řídit motorová vozidla ani vykonávat činnosti, vyžadující zvýšenou pozornost, schopnost soustředění a koordinaci pohybů.

Při předávkování nebo dojde-li k požití většího množství přípravku dítětem, vyhledejte ihned lékaře, protože je nutno okamžitě zahájit léčbu. U nemocného je třeba zvážit provedení výplachu žaludku.

Při léčbě přípravkem DISOPHROL REPETABS nesmíte současně užívat alkohol.

Uchovávání

Přípravek se uchovává při teplotě do 25 °C.

Varování

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení

8 tablet v blistru v jednom balení

Datum poslední revize

29.11.2006